


Manusept[®] basic

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion



**Basis Hände-Desinfektionsmittel für den alltäglichen Einsatz im Gesundheitsbereich.
Farbstoff- und parfümfrei. Hautverträglich und rückfettend.**



Manusept® basic



Eigenschaften

- wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren sowie gegen Rotaviren
- parfüm- und farbstofffrei
- hautverträglich, mit rückfettenden Inhaltsstoffen
- gutes Preis-Leistungsverhältnis

Manusept® basic ist ein alkoholisches Hände-Desinfektionsmittel für die alltägliche Infektionsverhütung im Gesundheitsbereich. Insbesondere für die hygienische Händedesinfektion auf Stationen geeignet, erfüllt Manusept® basic die empfohlene Basiswirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Zusätzlich ist das auf Ethanol basierende Hände-Desinfektionsmittel gegen Rotaviren wirksam und somit für die hygienische Händedesinfektion auf Säuglings- und Kinderstationen empfehlenswert.

Dank seiner hautverträglichen und rückfettenden Eigenschaften ist ein täglicher Einsatz des preisgünstigen Präparates problemlos möglich. Manusept® basic enthält keine Farb- und Parfümstoffe und stellt somit eine echte Anwendungsalternative für alle Hauttypen dar.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 80 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Gereinigtes Wasser, Heptamethylnonan, (2-Ethylhexyl)(2-ethylhexanoat), Tetradecan-1-ol, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, Natriumsalz.

Mikrobiologie

Manusept® basic wirkt bakterizid, levurozid und tuberkulozid. Es ist begrenzt viruzid und damit umfassend wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HIV, HCV)*. Das Wirksamkeitsspektrum umfasst zudem Rotaviren.

*gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Anwendungsgebiete

Der Einsatz von Manusept® basic als hygienisches Hände-Desinfektionsmittel empfiehlt sich im Gesundheitsbereich überall dort, wo eine Basis-Infektionsverhütung angezeigt ist:

- in stationären Einrichtungen
- in Behandlungsräumen und Ambulanzen
- im Krankentransportwagen
- im Labor, in Hauswirtschaftsbereichen
- im Rettungsdienst
- in Arztpraxen aller Fachrichtungen
- in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege
- bei der Hemodialyse
- in der Industrie

Darüber hinaus ist Manusept® basic auch für die chirurgische Händedesinfektion einsetzbar.

Listung

Zugelassen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) unter der Zul.-Nr. 6830003.00.00. Zertifikat/Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH) beantragt.



Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen	transparent, farblos
Dichte (20 °C)	ca. 0,84 g / cm ³
Flammpunkt (DIN 51755)	19,5 °C

Anwendung / Dosierung

Manusept® basic wird unverdünnt in die Hände und Unterarme eingerieben. Während der gesamten Einreibzeit sind die Hände und Unterarme mit dem Präparat feucht zu halten.

Die Dosierung von Manusept® basic ist abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet:

Hygienische Händedesinfektion

EN 1500

Versuch unter praxisnahen Bedingungen zur hygienischen Händedesinfektion

Phase 2 / Stufe 2

Hygienische Händedesinfektion 30 Sek.

Chirurgische Händedesinfektion

EN 12791

Versuch unter praxisnahen Bedingungen zur chirurgischen Händedesinfektion

Phase 2 / Stufe 2

Chirurgische Händedesinfektion 3 Min.

Bakterien inkl. *M.terrae* 30 Sek.

Pilze (*Candida albicans*) 30 Sek.

Viren

Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) 30 Sek.

Rotavirus 30 Sek.

Packungen

Packung	Einheit	Art.-Nr.
100 ml-Flasche	45 Stück	9756110
500 ml-Flasche	20 Stück	9756120
1000 ml-Flasche	10 Stück	9756100

Hinweis

Nicht in der Nähe von Heizkörpern lagern oder starker Sonnenbestrahlung aussetzen. Gebrauchsinformationen beachten!

Manusept® basic: *Wirkstoff:* Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Ethanol 99 % 80 g. *Sonstige Bestandteile:* Butan-2-on, Gereinigtes Wasser, Heptamethylnonan, (2-Ethylhexyl)(2-ethylhexanoat), Tetradecan-1-ol, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, Natriumsalz. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Manusept® basic ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht auf Schleimhäuten und in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Manusept® basic während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautrötungen sind selten. Das Auftreten von Juckreiz, Spannungsgefühl und Schuppung (auch im Rahmen allergischer Kontaktexzeme) ist möglich. **Warnhinweise:** Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5 °C, leicht entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit. Verdünnen mit viel Wasser. Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.



